

Instrucciones para esofagogastroduodenoscopia (EGD)

IMPORTANTE:

1. Debe concurrir con un conductor responsable. Si no cuenta con un conductor, será necesario que vuelva a programar su cita
2. **SUSPENDA** la fentermina y otros medicamentos reductores del peso 1 semana antes de su procedimiento.
3. Debe notificar al consultorio acerca de todos los medicamentos recetados que está tomando. Los pacientes con diabetes o enfermedad cardíaca podrían necesitar instrucciones específicas.
4. Es esencial que notifique al médico si toma **aspirina, Plavix, Coumadin (warfarina), Effient o Pradaxa.**

RECUERDE:

1. NO masque chicle ni coma caramelos duros el día de su procedimiento.
2. NO fume el día de su procedimiento.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

1. No puede comer nada incluyendo goma de mascar y caramelos duros.
2. Puede beber líquidos claros solo hasta 4 horas antes de su procedimiento.
3. Debe contar con alguien que lo lleve a su casa dado que recibirá sedantes intravenosos.
4. Si está tomando medicamentos para presión arterial, convulsiones, ansiedad o tiroides, tómelos según las indicaciones con un sorbito de agua.
5. No tome píldoras para la diabetes.
6. Disminuya su dosis de insulina a la mitad.
7. Puede lavarse los dientes, pero no tragar.

Si usa inhaladores, llévelos con usted al centro de endoscopia.

DEBE contar con alguien que lo lleve a su casa ya que recibirá medicamentos intravenosos que lo harán sentir somnoliento.

Llámenos de inmediato si tiene alguna pregunta o preocupación.

Endocentre at Quarterfield Station
7704 Quarterfield Rd.
Suite I
Glen Burnie, MD 21061
Teléfono: 410-863-4899

Endocentre of Baltimore
1838 Greene Tree Rd.
Suite 180
Baltimore, MD 21208
Teléfono: 410-602-7782