

Процедуру выполнит врач:

Адрес: _____

Дата проведения процедуры: _____ Подойдите ко времени: _____

Примечания: _____

Что можно есть за день **ДО** колоноскопии

Просим соблюдать высокоусвояемую диету и не принимать пищу после начала подготовки кишечника. Ешьте разрешенные продукты, если иное не предписано врачом.

Что вы **МОЖЕТЕ** делать

- Вы можете съесть только высокоусвояемый завтрак. Высокоусвояемые продукты на завтрак - это яйца, белый хлеб, творог, йогурт, крупы, кофе и чай.
- Вы можете пить прозрачные жидкости.

Чего вам **НЕЛЬЗЯ** делать

- Нельзя пить молоко, есть и пить продукты красного или пурпурного цвета.
- Нельзя употреблять спиртные напитки.
- Не принимайте другие слабительные средства в период приема препарата SUFLAVE.
- Нельзя принимать пероральные препараты в течение 1 часа до начала приема каждой дозы препарата SUFLAVE.
- Если вы принимаете антибиотики тетрациклинового или фторхинолонового ряда, препараты железа, дигоксин, хлорпромазин или пеницилламин, то эти препараты следует принимать не менее чем за 2 часа до и не менее чем через 6 часов после приема каждой дозы препарата SUFLAVE.

Жидкости, которые **МОЖНО** пить

- Кофе или чай (без сливок и искусственных подсластителей)
- Фруктовые соки (без мякоти)
- Желе (без фруктов или топпинга)
- Вода
- Лимонад
- Куриный бульон

Примечания

- SUFLAVE — это осмотическое слабительное средство, предназначенное для очищения толстой кишки при подготовке к колоноскопии у взрослых.
- Обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и растительные добавки. Препарат SUFLAVE может повлиять на действие других лекарств.
- Если лекарство было принято перорально в течение 1 часа перед приемом любой дозы препарата SUFLAVE, то его всасывание может происходить не в полной мере.
- Наиболее распространенными нежелательными реакциями после приема препарата SUFLAVE были тошнота, вздутие живота, рвота, боли в животе и головная боль.
- При появлении тошноты, вздутия живота или спазмов в животе, сделайте паузу или пейте раствор и дополнительную воду медленнее, пока симптомы не уменьшатся.
- Если после приема препарата SUFLAVE у вас возникнет сильная рвота или появятся признаки обезвоживания, нарушения сердечного ритма или судороги, вам следует обратиться в медицинское учреждение.
- Если у вас возникнут вопросы по поводу приема препарата SUFLAVE, пожалуйста, обратитесь к своему врачу.

Необходимо прочитать полную инструкцию по применению препарата и листок-вкладыш, поставляемые в комплекте.

Подробную информацию о препарате вы можете получить по телефону 1-800-874-6756.



Флаконы и пакетики показаны на рисунке не в натуральную величину.

SUFLAVE™
(полиэтиленгликоль 3350, натрия сульфат, калия хлорид, магния сульфат и натрия хлорид для приготовления раствора для перорального применения)
178,7 г/7,3 г/1,12 г/0,9 г/0,5 г

Режим дозирования

Препарат SUFLAVE принимается в течение двух дней. В общей сложности для полной подготовки к колоноскопии требуются 2 флакона. Вам будет нужно принять 2 флакона жидкости за два отдельных приема. Одна доза препарата SUFLAVE равна одному флакону плюс один пакетик с ароматизатором.



Обозначения



Пакетик с ароматизатором



1-литровый флакон

День 1, доза 1: рано вечером в день перед колоноскопией

Примите дозу 1 в _____ вечера.

ШАГ 1

Откройте 1 пакетик с ароматизатором и пересыпьте его содержимое в 1 флакон.

ШАГ 2

Наполните этот флакон слегка теплой водой до линии заполнения. Закройте флакон и осторожно встряхните его, чтобы весь порошок хорошо перемешался (растворился). Для улучшения вкуса охладите раствор в течение часа до употребления. Не замораживайте. Используйте в течение 24 часов.

ШАГ 3

Выпивайте по 8 унций (236 мл) раствора каждые 15 минут, пока флакон не опустеет.

ШАГ 4

Выпейте еще 16 унций (473 мл) воды в течение вечера.

ВНИМАНИЕ: при появлении тошноты, вздутия живота или спазмов в животе, сделайте паузу или пейте раствор и дополнительную воду медленнее, пока симптомы не уменьшатся.



Флаконы и пакетики показаны на рисунке не в натуральную величину.

День 2, доза 2: утром в день колоноскопии (за 5–8 часов до колоноскопии и не раньше чем через 4 часа после начала приема дозы 1)

Примите дозу 2 в _____ утра.

ШАГ 1

Повторите шаги 1–3, указанные для приема дозы 1 в день 1.

ШАГ 2

Выпейте еще 16 унций (473 мл) воды в течение утра.

ВНИМАНИЕ: до колоноскопии продолжайте употреблять только прозрачные жидкости. Не менее чем за 2 часа до колоноскопии следует прекратить прием жидкостей.



Флаконы и пакетики показаны на рисунке не в натуральную величину.

Не менее чем за 2 часа до колоноскопии следует прекратить прием жидкостей.

Предоставляется в качестве образовательной услуги компанией **Braintree**
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS*