

Su procedimiento estará a cargo del doctor:

Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha del procedimiento: \_\_\_\_\_ Hora de llegada: \_\_\_\_ a. m./p. m.

Comentarios: \_\_\_\_\_

## Alimentos permitidos el día ANTERIOR a la colonoscopia

Siga una dieta con pocos residuos y no coma nada después de empezar la preparación intestinal. Consuma los alimentos permitidos, a menos que su médico le recomiende algo diferente.

### Lo que PUEDE hacer

- Puede consumir únicamente un desayuno con pocos residuos. Algunos desayunos con pocos residuos son huevos, pan blanco, queso cottage, yogur, sémola de maíz, café y té.
- Puede beber líquidos transparentes.

### Lo que NO PUEDE hacer

- No beba leche, ni consuma nada de color rojo ni morado.
- No beba alcohol.
- No use otros laxantes mientras toma SUFLAVE.
- No tome medicamentos por vía oral en el lapso de una hora antes del inicio de cada dosis de SUFLAVE.
- Si está tomando antibióticos de las familias de la tetraciclina o fluoroquinolona, hierro, digoxina, clorpromazina o penicilamina, tome estos medicamentos al menos 2 horas antes y no menos de 6 horas después de la administración de cada dosis de SUFLAVE.

### Líquidos que PUEDE beber

- Café, té (sin crema ni sustituto de crema no lácteo)
- Jugos de fruta (sin pulpa)
- Postres de gelatina (sin fruta ni cobertura)
- Agua
- Limonada
- Caldo de pollo

### Nota

- SUFLAVE es un laxante osmótico indicado para la limpieza del colon en preparación para la colonoscopia en adultos.
- Asegúrese de informar a su médico acerca de todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios. SUFLAVE puede afectar la eficacia de otros medicamentos.
- Los medicamentos que se toman por vía oral pueden no absorberse adecuadamente cuando se ingieren menos de una hora antes del inicio de cada dosis de SUFLAVE.
- Las reacciones adversas más comunes tras la administración de SUFLAVE fueron náuseas, distensión abdominal, vómitos, dolor abdominal y dolor de cabeza.
- Si presenta náuseas, hinchazón o cólicos abdominales, interrumpa o reduzca el ritmo de consumo de la solución y beba agua hasta que los síntomas disminuyan.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta vómitos considerables o signos de deshidratación después de tomar SUFLAVE o si experimenta arritmias cardíacas o convulsiones.
- Si tiene preguntas acerca del uso de SUFLAVE, llame a su médico.

Lea la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento incluidas en el kit.

Para obtener más información sobre este producto, llame al 1-800-874-6756.



Los frascos y los sobres no representan el tamaño real.

**SUFLAVE™**  
(polietilenglicol 3350, sulfato de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio y cloruro de sodio para solución oral)  
178.7 g/7.3 g/1.12 g/0.9 g/0.5 g

## Esquema de administración

SUFLAVE se administra en dosis divididas (2 días). La preparación completa para la colonoscopia requiere un total de 2 frascos. Usted deberá beber 2 frascos de líquido en dos dosis separadas. Cada dosis de SUFLAVE equivale a un frasco con un sobre saborizante.



### Día 1, dosis 1: al principio de la noche anterior a la colonoscopia

Inicio de la dosis 1: \_\_\_\_ p. m.

- PASO 1** Abra un sobre saborizante y vierta el contenido en el frasco.
- PASO 2** Llene el frasco suministrado con agua tibia hasta la marca de llenado. Cierre el frasco y agítelo suavemente para mezclar (disolver) todo el polvo. Para mejorar el sabor, refrigere la solución durante una hora antes de beberla. No congele. Use en un plazo de 24 horas.
- PASO 3** Beba 8 onzas de la solución cada 15 minutos hasta que el frasco esté vacío.
- PASO 4** Beba 16 onzas adicionales de agua durante la noche.

**IMPORTANTE:** si presenta náuseas, hinchazón o cólicos abdominales, interrumpa o reduzca el ritmo de consumo de la solución y beba agua hasta que los síntomas disminuyan.



Los frascos y los sobres no representan el tamaño real.

### Día 2, dosis 2: la mañana de la colonoscopia (de 5 a 8 horas antes de la colonoscopia y no antes de 4 horas después de iniciar la dosis 1)

Inicio de la dosis 2: \_\_\_\_ a. m.

- PASO 1** Repita los pasos 1 al 3 del día 1, dosis 1.
- PASO 2** Beba 16 onzas adicionales de agua durante la mañana.

**IMPORTANTE:** continúe bebiendo solo líquidos claros hasta la colonoscopia. Deje de beber líquidos al menos 2 horas antes de la colonoscopia.



Los frascos y los sobres no representan el tamaño real.

Deje de beber líquidos al menos 2 horas antes de la colonoscopia.

Se proporciona como un servicio educativo de **Braintree**  
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS®